



## Gebrauchsinformation

ARDEYPHARM GmbH · 58313 Herdecke

# Adclair® Creme

Wirkstoff: Nystatin



### Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen ADICLAIR® Creme verordnet, über deren Anwendung wir Sie gern informieren möchten.

### Zusammensetzung:

1 g ADICLAIR® Creme enthält 100.000 I.E. Nystatin,

Sonstige Bestandteile: Methyl-4-hydroxybenzoat (Parabene) als Konservierungsmittel. Polyoxyethylenstearat-40, Polyoxyethylenstearat-100, Cetylalkohol, Sorbitansesquioleat, Glycerolmonostearat, dickflüssiges Paraffin, Propylenglykol.

### Anwendungsgebiete:

Nystatinempfindliche Pilzinfektionen (*Candida albicans* und andere) der Haut und der Schleimhaut wie Pilzinfektionen im Anal- und Genitalbereich, am Kopf, an den Händen und Füßen sowie des gesamten Körperbereiches.

### Gegenanzeigen:

ADICLAIR® Creme sollte nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Nystatin.

Darf nicht bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Alkyl-4-hydroxybenzoaten (Parabenen) angewendet werden.

### Nebenwirkungen:

Das in der ADICLAIR® Creme enthaltene Nystatin wird bei äußerlicher Anwendung im allgemeinen gut vertragen. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Hinweis:

Bei der Behandlung mit ADICLAIR® Creme im Genital- oder Analbereich kann es wegen des Hilfsstoffes Paraffin bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit solcher Kondome kommen.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 2–3 mal täglich dünn auftragen und leicht einreiben, in schweren Fällen auch häufiger.

Nach Abklingen der Erkrankung sollte die Anwendung zur Sicherung des Behandlungserfolges weitere 8–10 Tage fortgesetzt werden.

### Hinweise:

ADICLAIR® Creme nicht über 25 °C lagern!

Nach Ablauf des Verfalldatums soll ADICLAIR® Creme nicht mehr angewendet werden.

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**



### **Eigenschaften:**

Das in ADICLAIR® Creme enthaltene Nystatin wirkt spezifisch gegen Infektionserkrankungen mit *Candida albicans* und anderen Pilzen. Dabei wird das Nystatin an die Zellmembranen gebunden, hemmt das Wachstum und zerstört die Pilzzellen.

### **Unterstützende Maßnahmen:**

Die Bekleidung sollte luftdurchlässig und nicht zu eng gewählt werden, um feucht-warme Bedingungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich Baumwollwäsche zu tragen. Die Wäsche sowie Waschlappen und Handtücher sollten häufig gewechselt und ausgekocht werden.

Ferner kann es erforderlich sein, zusätzlich eine Pilzinfektion des Magendarmtraktes zu behandeln.

### **Darreichungsformen und Packungsgrößen:**

Packungen mit 20 g Creme, N1

Packungen mit 50 g Creme, N2

Packungen mit 20 g Salbe, N1

Packungen mit 50 g Salbe, N2

Packungen mit 100 g Salbe, N3

Für die Behandlung von Pilzinfektionen des Mund- und Rachenraumes, der Speiseröhre und des Magendarmtraktes stehen für Erwachsene und Kinder weiterhin zur Verfügung:

Packungen mit 20 Filmtabletten, N1

Packungen mit 50 Filmtabletten, N2

Packungen mit 100 Filmtabletten, N3

Packungen mit 24 ml Suspension, N1

Packungen mit 48 ml Suspension, N2

5930502

