

## Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Adiclair® Filmtabletten

Wirkstoff: Nystatin



### Zusammensetzung:

*Arzneilich wirksame Bestandteile:* 1 Filmtablette enthält 500.000 I.E. Nystatin

*Sonstige Bestandteile:* Lactose, Stearinpalmitinsäure, Magnesiumstearat, Polyvidon, Talkum, Propylenglykol, Natriumcarboxymethylstärke, Methylhydroxypropylcellulose, Titandioxid, Cellulosepulver, Hochdisperses Siliciumdioxid, Farbstoff E 172 (Eisenoxid).

### Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackungen mit 20 Filmtabletten (N1)

Originalpackungen mit 50 Filmtabletten (N2)

Originalpackungen mit 100 Filmtabletten (N3)

Arzneimittel zur Vorbeugung und Behandlung von nystatinempfindlichen Pilzinfektionen.

### Anwendungsgebiete:

ADICLAIR® dient der Behandlung und Vorbeugung von Hefeinfektionen Ihres Magendarmtraktes. Bei bestehenden Organ-, Schleimhaut- oder vaginalen Hefeinfektionen (Candida-Flor) beseitigt bzw. vermindert ADICLAIR® das Hefevorkommen im Magendarmtrakt.

### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie ADICLAIR® Filmtabletten nicht einnehmen?*

ADICLAIR® Filmtabletten sollten nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Nystatin.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

*Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?*

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

*Worauf müssen Sie noch achten?*

Achten Sie stets darauf, daß Sie ADICLAIR® Filmtabletten so aufbewahren, daß es für Kinder nicht zu erreichen ist!

Für Diabetiker ist die Einnahme von ADICLAIR® Filmtabletten mit 0,05 BE anzurechnen.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von ADICLAIR® Filmtabletten?*

Keine bekannt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt ADICLAIR® Filmtabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschrift, da ADICLAIR® Filmtabletten sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel von ADICLAIR® Filmtabletten und wie oft sollten Sie ADICLAIR® Filmtabletten einnehmen?*

Zur Behandlung von Hefeinfektionen des Magendarmtraktes nehmen Sie bitte 3mal täglich 2 Filmtabletten (1.000.000 I.E. Nystatin) ein.

Zur Vorbeugung von Hefeinfektionen, z.B. während der Behandlung mit Medikamenten, die das Hefewachstum fördern, nehmen Sie bitte 3mal täglich 1 Filmtablette (500.000 I.E. Nystatin) ein. Zur Verminderung oder Beseitigung des Hefevorkommens im Magendarmtrakt bei bestehenden Organ-, Schleimhaut- oder vaginalen Hefeinfektionen (Candida-Fluor) sollten Sie 3mal täglich 1–2 Filmtabletten (500.000 – 1.000.000 I.E. Nystatin) einnehmen.

*Wie und wann sollten Sie ADICLAIR® Filmtabletten einnehmen?*

Die Filmtabletten sollten nach den üblichen Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) eingenommen werden.

*Wie lange sollten Sie ADICLAIR® Filmtabletten einnehmen?*

Um einen dauerhaften Behandlungserfolg zu erzielen, sollten Sie ADICLAIR® Filmtabletten mindestens 2 Wochen lang regelmäßig einnehmen.

**Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von ADICLAIR® Filmtabletten auftreten?*

Das in ADICLAIR® Filmtabletten enthaltene Nystatin wird im allgemeinen gut vertragen. Zu hohe tägliche Dosierungen können gelegentlich bei empfindlichen Patienten das Auftreten vorübergehender Störungen im Magendarmbereich begünstigen.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Beim Auftreten von Nebenwirkungen setzen Sie ADICLAIR® Filmtabletten bitte ab, und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist außen auf dem Umkarton und auf den Folien, welche die Filmtabletten enthalten, aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum. Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

**Stand der Information:**

5350501

Dezember 2000

---

**Eigenschaften:**

Das in ADICLAIR® Filmtabletten enthaltene Nystatin wirkt spezifisch gegen Infektionserkrankungen mit *Candida albicans* und anderen Pilzen. Dabei wird das Nystatin an die Zellmembranen der Pilze gebunden, hemmt das Wachstum und zerstört die Pilzzellen. Der Wirkstoff Nystatin wird nach der Einnahme nicht aus dem Darm ins Blut aufgenommen und ist daher praktisch un-toxisch. Nach der Darmpassage wird der Wirkstoff mit dem Stuhl ausgeschieden.

**Unterstützende Maßnahmen:**

Die medikamentöse Therapie von Hefepilz-Infektionen kann wesentlich durch diätetische Maßnahmen unterstützt werden. Zucker (Kohlenhydrate), alle Früchte, auch Obstsaft, Süßigkeiten und Stärkeerzeugnisse, wie Kuchen, Weißbrot und Mehlspeisen, sind stark einzuschränken oder möglichst zu meiden. Zu empfehlen sind Gemüse, Salate, Fleisch, Fisch, Eierspeisen und Milchprodukte. Vollkornbrot in mäßigem Umfang.

**Weitere Darreichungsformen und Packungsgrößen:**

Für die Behandlung von nystatinempfindlichen Pilzinfektionen des Mund- und Rachenraumes und der Speiseröhre steht ADICLAIR® auch als Suspension und als Mundgel zur Verfügung:

Originalpackungen mit	24 ml Suspension (N1)	25 g Mundgel (N1)
	48 ml Suspension (N2)	50 g Mundgel (N2)

---

**ARDEYPHARM GmbH**

58313 Herdecke · Loerfeldstraße 20 · Telefon (0 23 30) 977 677