



Gebrauchsinformation

ARDEYPHARM GmbH · 58313 Herdecke

Adiclair[®] Salbe

Wirkstoff: Nystatin

ARDEYPHARM



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen ADICLAIR[®] Salbe verordnet, über deren Anwendung wir Sie gern informieren möchten.

Zusammensetzung:

1 g ADICLAIR[®] Salbe enthält 100.000 I.E. Nystatin.

Hilfsstoffe: dickflüssiges Paraffin, Zinkoxid, Polyethylen.

Anwendungsgebiete:

Nystatinempfindliche Pilzinfektionen (*Candida albicans* und andere) der Haut des gesamten Körpers, insbesondere Behandlung von Mykosen im Bereich der Hautfalten und im Windelbereich (mykotische Windeldermatitis).

Gegenanzeigen:

ADICLAIR[®] Salbe sollte nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Nystatin.

Nebenwirkungen:

Das in der ADICLAIR[®] Salbe enthaltene Nystatin wird bei äußerlicher Anwendung im allgemeinen gut vertragen. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 2–3 mal täglich auf die erkrankten Hautpartien auftragen, in schweren Fällen auch häufiger.

Nach Abklingen der Erkrankung sollte die Anwendung zur Sicherung des Behandlungserfolges weitere 8–10 Tage fortgesetzt werden.

Hinweise:

ADICLAIR[®] Salbe nicht über 25°C lagern!

Nach Ablauf des Verfalldatums soll ADICLAIR[®] Salbe nicht mehr angewendet werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!



**Eigenschaften:**

Das in ADICLAIR® Salbe enthaltene Nystatin wirkt spezifisch gegen Infektionserkrankungen mit *Candida albicans* und anderen Pilzen. Dabei wird das Nystatin an die Zellmembranen gebunden, hemmt das Wachstum und zerstört die Pilzzellen.

Unterstützende Maßnahmen:

Die Bekleidung sollte luftdurchlässig und nicht zu eng gewählt werden, um feucht-warme Bedingungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich Baumwollwäsche zu tragen. Die Wäsche sowie Waschlappen und Handtücher sollten häufig gewechselt und ausgekocht werden.

Ferner kann es erforderlich sein, zusätzlich eine Pilzinfektion des Magen-Darmtraktes zu behandeln.

Darreichungsformen und Packungsgrößen:

Packungen mit 20 g Salbe, N1

Packungen mit 50 g Salbe, N2

Packungen mit 100 g Salbe, N3

Packungen mit 20 g Creme, N1

Packungen mit 50 g Creme, N2

Für die Behandlung von Pilzinfektionen des Mund- und Rachenraumes, der Speiseröhre und des Magen-Darmtraktes stehen für Erwachsene und Kinder weiterhin zur Verfügung:

Packungen mit 20 Filmtabletten, N1

Packungen mit 50 Filmtabletten, N2

Packungen mit 100 Filmtabletten, N3

Packungen mit 24 ml Suspension, N1

Packungen mit 48 ml Suspension, N2

5920694

