

Gebrauchsinformation

ARDEYPHARM GmbH · 58313 Herdecke

Adiclair® Suspension

Wirkstoff: Nystatin



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen ADICLAIR® Suspension verordnet, über deren Anwendung wir Sie gern informieren möchten.

Zusammensetzung:

1 ml ADICLAIR® Suspension enthält 100.000 I.E. Nystatin, Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene) als Konservierungsmittel.

Hilfsstoffe: Glycerol, Saccharose, Aromastoffe.

Anwendungsgebiete:

Nystatinempfindliche Pilzinfektionen des Mund- und Rachenraumes, der Speiseröhre und des Magendarmtraktes (Candidainfektionen).

Gegenanzeigen:

ADICLAIR® Suspension sollte nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Nystatin.

Nebenwirkungen:

Das in ADICLAIR® Suspension enthaltene Nystatin wird bei oraler Anwendung im allgemeinen gut vertragen. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Aufgrund des Gehaltes an Alkyl-4-hydroxybenzoaten (Parabenen) können bei entsprechend veranlagten Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Vor jedem Gebrauch kräftig schütteln! Die Pipette ist mit einer Schutzhülle versehen, die vor Gebrauch durch Abschrauben zu entfernen ist.

Soweit nicht anders verordnet, gelten folgende Empfehlungen:

Säuglinge:

Bei Befall von Mund, Rachen und Speiseröhre (z.B. Mundsoor) 3–6 mal täglich 0,5–1 ml Suspension nach den Mahlzeiten in den Mund träufeln.

Bei Befall des Magendarmtraktes 3–6 mal täglich 1–2 ml Suspension nach den Mahlzeiten in den Mund träufeln.

Kinder und Erwachsene:

Bei Befall von Mund, Rachen und Speiseröhre (z.B. Mundsoor) 3–6 mal täglich 1 ml Suspension nach den Mahlzeiten in den Mund träufeln.

Die Suspension sollte möglichst lange im Mund bewegt werden, bevor sie geschluckt wird.

Bei Befall der Speiseröhre soll die Suspension möglichst im Liegen geschluckt werden. Die Behandlungsdauer sollte mindestens 2 Wochen betragen und unter Umständen verlängert werden.

Hinweise:

Die Einnahme der Suspension ist unter Berücksichtigung der Proteinheiten (BE) auch für Diabetiker möglich. Pro ml Suspension sind weniger als 0,05 BE enthalten.

ADICLAIR® Suspension nicht über 25°C lagern!

Nach Ablauf des Verfalldatums soll ADICLAIR® Suspension nicht mehr angewendet werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Eigenschaften:

Das in ADICLAIR® Suspension enthaltene Nystatin wirkt spezifisch gegen Infektionserkrankungen mit *Candida albicans* und anderen Pilzen. Dabei wird das Nystatin an die Zellmembranen gebunden, hemmt das Wachstum und zerstört die Pilzzellen. ADICLAIR® Suspension wird nach Einnahme nicht aus der Mundschleimhaut oder dem Darm ins Blut aufgenommen und ist daher praktisch untoxisch. Nach der Darmpassage wird der Wirkstoff mit dem Stuhl ausgeschieden.

Unterstützende Maßnahmen:

Die ADICLAIR®-Therapie kann wesentlich durch diätetische Maßnahmen unterstützt werden. Kohlenhydrate, alle Früchte, auch Obstsäfte, Süßigkeiten und Stärkeerzeugnisse, wie Kuchen, Weißbrot und Mehlspeisen, sind stark einzuschränken oder möglichst zu meiden.

Zu empfehlen sind Gemüse, Salate, Fleisch, Fisch, Eierspeisen und Milchprodukte, Vollkornbrot in mäßigem Umfang.

Darreichungsform und Packungsgrößen:

Packungen mit 24 ml Suspension zum Einnehmen, N1

Packungen mit 48 ml Suspension zum Einnehmen, N2

Für die Behandlung von Pilzinfektionen des Darmes stehen für Erwachsene und Kinder weiterhin zur Verfügung:

Packungen mit 20 Filmtabletten zum Einnehmen, N1

Packungen mit 50 Filmtabletten zum Einnehmen, N2

Packungen mit 100 Filmtabletten zum Einnehmen, N3

5910999

