



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Adiclair[®] Vaginaltabletten

Wirkstoff: Nystatin

ARDEYPHARM



Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 Vaginaltablette enthält 100.000 I.E. Nystatin

Sonstige Bestandteile: Cellulosepulver, Lactose, Magnesiumstearat, Maisstärke, Polyvidon, Carboxymethylstärke-Natrium, Saccharose, Hochdisperses Siliciumdioxid.

Darreichungsform und Inhalt:

Packungen mit 12 Vaginaltabletten, N2

Arzneimittel zur Behandlung von nystatinempfindlichen Pilzinfektionen der Vulva und Vagina.

Anwendungsgebiete:

Zur Behandlung von nystatinempfindlichen Pilzinfektionen der Vulva und Vagina.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie ADICLAIR[®] Vaginaltabletten nicht anwenden?

ADICLAIR[®] Vaginaltabletten sollten nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Nystatin.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Worauf müssen Sie noch achten?

Achten Sie stets darauf, dass Sie ADICLAIR[®] Vaginaltabletten so aufbewahren, dass es für Kinder nicht zu erreichen ist!

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von ADICLAIR[®] Vaginaltabletten?

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt ADICLAIR[®] Vaginaltabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschrift, da ADICLAIR[®] Vaginaltabletten sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von ADICLAIR[®] Vaginaltabletten und wie oft sollten Sie

ADICLAIR[®] Vaginaltabletten anwenden?

Führen Sie bitte 1mal täglich 1–2 Vaginaltabletten (100.000 – 200.000 I.E. Nystatin) tief in die Scheide ein.


Wie und wann sollten Sie ADICLAIR[®] Vaginaltabletten anwenden?

Die Vaginaltabletten sollten vor dem Schlafengehen tief in die Scheide eingeführt werden.

Wie lange sollten Sie ADICLAIR[®] Vaginaltabletten anwenden?

ADICLAIR[®] Vaginaltabletten sollten an 6 aufeinanderfolgenden Tagen angewendet werden.

Durch eine ärztliche Nachuntersuchung sollte geklärt werden, ob die Behandlung erfolgreich verlaufen oder fortzusetzen ist. Bei wiederholtem Auftreten von vaginalen Pilzinfektionen ist es zweckmäßig, gleichzeitig ADICLAIR[®] Filmtabletten einzunehmen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Anwendung hormonaler Kontrazeptiva („Pille“) die Entwicklung einer vaginalen Pilzinfektion begünstigt.



Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von ADICLAIR® Vaginaltabletsen auftreten?

Das in ADICLAIR® Vaginaltabletsen enthaltene Nystatin wird im allgemeinen gut vertragen. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Beim Auftreten von Nebenwirkungen setzen Sie ADICLAIR® Vaginaltabletsen bitte ab, und sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist außen auf dem Umkarton und auf den Folien, welche die Vaginaltabletsen enthalten, aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Stand der Information:

5950401

Dezember 2000

Eigenschaften:

Das in ADICLAIR® Vaginaltabletsen enthaltene Nystatin wirkt spezifisch gegen Infektionskrankungen mit *Candida albicans* und anderen Pilzen. Dabei wird das Nystatin an die Zellmembranen gebunden, hemmt das Wachstum und zerstört die Pilzzellen.

Unterstützende Maßnahmen:

Eine gleichzeitige Behandlung des Partners ist zweckmäßig.

Die Bekleidung sollte luftdurchlässig und nicht zu eng gewählt werden, um feuchtwarme Bedingungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich Baumwollwäsche zu tragen. Die Wäsche sowie Waschlappen und Handtücher sollten häufig gewechselt und ausgekocht werden.

Ferner kann es erforderlich sein, zusätzlich eine Pilzinfektion des Magendarmtraktes zu behandeln.

Weitere Darreichungsformen und Packungsgrößen:

Für die Behandlung von nystatinempfindlichen Pilzinfektionen der Haut- und der Schleimhaut, wie Pilzinfektionen im Anal- und Genitalbereich, am Kopf, an den Händen und Füßen sowie des gesamten Körperbereichs steht ADICLAIR® als Creme zur Verfügung:

Packungen mit 20 g Creme (N1)
50 g Creme (N2)

Für die gleichzeitige Behandlung von Pilzinfektionen der Haut sowie der Vagina und Vulva steht ADICLAIR® auch als Kombipackung zur Verfügung:

Kombipackungen mit 20 g Creme (N1) und
12 Vaginaltabletsen (N2)

Für die Behandlung von nystatinempfindlichen Pilzinfektionen des Mund- und Rachenraumes, der Speiseröhre und des Magendarmtraktes steht ADICLAIR® auch als Suspension, Mundgel und als Filmtablette zur Verfügung:

Packungen mit 25 g Mundgel (N1) 24 ml Suspension (N1)
50 g Mundgel (N2) 48 ml Suspension (N2)
20 Filmtabletsen zum Einnehmen (N1)
50 Filmtabletsen zum Einnehmen (N2)
100 Filmtabletsen zum Einnehmen (N3)

ARDEYPHARM GmbH

58313 Herdecke · Loerfeldstraße 20 · Telefon (0 23 30) 977 677

