



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

ARDEYPHARM GmbH · 58313 Herdecke · Loerfeldstr. 20 · Tel. (0 23 30) 977 677

Mykotin[®] Creme

Wirkstoff: Miconazolnitrat

ARDEYPHARM



Zusammensetzung:

1 g Creme enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Miconazolnitrat 20 mg

Sonstige Bestandteile:

Benzoessäure, Macrogolstearat 1500, Poly(oxyethylen)-x-glyceroltri (oleat, linolat), dickflüssiges Paraffin, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt:

Tube zu 20 g (N1)

Tube zu 50 g (N2)

Antimykotikum (pilztötendes Mittel gegen Pilzbefall)

Anwendungsgebiete:

- Interdigitalmykose
- Mykosen der Haut und Hautfalten
- oberflächliche Kandidosen

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie MYKOTIN[®] Creme nicht anwenden?

MYKOTIN[®] Creme darf nicht angewendet werden bei:

- bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Miconazol und Benzoessäure,
- bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Während der Stillzeit soll eine Anwendung an der Brust vermieden werden, um einen direkten Kontakt des Säuglings mit der Creme zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Keine.



Wechselwirkungen:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von MYKOTIN® Creme?

Bei der Anwendung auf der Haut sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Da der Wirkstoff praktisch nicht in den Blutkreislauf gelangt, sind Wechselwirkungen auch nicht zu erwarten.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt MYKOTIN® Creme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da MYKOTIN® Creme sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von MYKOTIN® Creme und wie oft sollten Sie MYKOTIN® Creme anwenden?

1 – 3mal täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen.

Wie und wann sollten Sie MYKOTIN® Creme anwenden?

Die Creme wird morgens und abends aufgetragen und leicht mit dem Finger einmassiert.

Wie lange sollten Sie MYKOTIN® Creme anwenden?

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem klinischen Bild.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu beachten, wenn Sie zu viel oder zu wenig MYKOTIN® Creme angewendet haben?

Holen Sie eine vergessene Behandlung nach und führen Sie die Therapie in gewohnter Weise weiter.

Wenn Sie zuviel Creme aufgetragen haben sind keine Folgen zu erwarten. Sollten Sie jedoch ungewöhnliche Symptome feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt in Verbindung.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Die Behandlung sollte bis zum Ende durchgeführt werden, auch wenn die Symptome schon beseitigt sind. Die Infektion kann immer noch bestehen und möglicherweise wieder ausbrechen, wenn das Mittel zu früh abgesetzt wird.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von MYKOTIN® Creme auftreten?

Selten kann es unter Anwendung des Präparates zu Reizungen mit Rötung, Stechen und/oder Brennen kommen.

Wenn sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel aufgedruckt.

Bitte verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nach Anbruch der Tube beträgt die Haltbarkeit 12 Wochen.

Stand der Information:

Juni 2002

7600602

